

1ère - Son PERTE AUDITIVE APRÈS UN CONCERT

Fabrice a passé une soirée au concert donné par les élèves du lycée. Dans les semaines qui suivent, il ressent une grande fatigue et ne semble pas toujours entendre les questions qu'on lui pose. Ses parents lui reprochent d'écouter la musique trop fort. Inquiet, Fabrice passe des examens médicaux fonctionnels et anatomiques.

En utilisant les documents :

- 1- Montrer que la perte auditive moyenne de Fabrice sur les deux oreilles est comprise entre 40 et 45 dB.
- 2- Indiquer si les symptômes présentés par Fabrice correspondent à la perte auditive constatée.
- 3- Expliquer l'origine physiologique de ces troubles en mobilisant vos connaissances.



Document 1. Audiogrammes de Fabrice

Un audiogramme permet d'évaluer la perte d'audition d'une personne mesurée en décibel (dB) en fonction de la fréquence du son émis en Hertz (Hz). Il s'obtient par un test réalisé chez un médecin spécialisé.

L'objectif du test est de mesurer, pour différentes fréquences, le niveau d'intensité sonore minimal (seuil d'audition) pour que le son soit entendu par Fabrice. Les fréquences sonores testées sont comprises entre 500 et 8 000 Hz.

Légende des audiogrammes :

- ◆— : norme auditive moyenne
- : réponse auditive de Fabrice lors du test médical



Document 2. Méthode de calcul de la perte auditive moyenne sur les deux oreilles

- Pour chacune des fréquences 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz, et pour chaque oreille, on calcule la différence entre l'intensité du son audible par le patient et la norme auditive moyenne.
- On note Pmd la moyenne de ces 4 valeurs pour l'oreille droite et Pmg la moyenne de ces valeurs pour l'oreille gauche.
- La fonction Python ci-dessous permet alors de calculer la perte auditive moyenne (sur les deux oreilles) :

```
def Perte auditive moyenne
(Pmd,Pmg) :
    if -15 <= Pmg-Pmd <= 15 :
        Pm = 0.5 * Pmd + 0.5 * Pmg
    else :
        if Pmg - Pmd > 15 :
            Pm = 0.7 * Pmd + 0.3 * Pmg
        else :
            Pm = 0.3 * Pmd + 0.7 * Pmg
    return Pm
```

Document 3. Niveaux de surdit  et sympt mes associ s

Degr� de la perte auditive	Perte auditive moyenne	Sympt�mes, cons�quences
Audition "normale"	de 0 � 20 dB	Vous n'�prouvez aucune difficult� particuli�re, <u>en milieu calme ou bruyant</u> .
Perte l�g�re	de 20 � 40 dB	Vous avez des difficult�s � percevoir <u>les voix faibles ou lointaines</u> et les conversations, surtout lorsque vous �tes en milieu bruyant.
Perte moyenne	de 40 � 70 dB	<u>La perception des paroles devient difficile</u> , il faut que celles-ci soient fortes pour que vous puissiez les comprendre ais�ment. Vous avez <u>tendance � augmenter le volume de la t�l�vision, radio, mp3...</u> Suivre une conversation en groupe devient tr�s compliqu� et fatigant.
Perte s�v�re	de 70 � 90 dB	Vous n'entendez pas les paroles, � moins que celles-ci soient fortes ou proche de vous. Il est tr�s difficile pour vous de suivre une conversation, voire impossible si vous n'�tes pas �quip� d'aides auditives. Certains sons forts restent audibles.
Perte profonde	90 dB et +	La plupart des sons deviennent imperceptibles, quel que soit l'environnement d'�coute. Vous n'arrivez pas � communiquer, <u>suivre une conversation est impossible sans appareil auditif</u> , certains sons extr�mement forts restent toutefois audibles.
Surdit� totale	120 dB	Aucune capacit� d'audition mesurable.

D'apr s : <https://www.laboratoires-unisson.com/perte-auditive-causes-et-consequence-de-la-perte-d-audition.html>