

EXERCICES au choix du candidat (5 points)

Vous indiquerez sur votre copie **les 2 exercices choisis** :
exercice **A** ou exercice **B** ou exercice **C**.

EXERCICE A. OBSERVATION D'UN SATELLITE

Mots-clés : deuxième loi de Newton ; période de révolution ; lunette astronomique.

Les 18 mars et 22 avril 2020, deux fusées ont chacune mis en orbite soixante satellites de type « Starlink ». À terme, ce sont près de 12 000 satellites similaires qui doivent être mis en orbite.

L'objectif est de constituer un réseau de satellites, permettant un accès à internet en tout point de la planète.

D'après <https://theconversation.com/starlink-les-dommages-collateraux-de-la-flotte-de-satellites-delon-musk-135330>

Données :

- masse de la Terre : $M_T = 5,97 \times 10^{24}$ kg ;
- rayon de la Terre : $R_T = 6\,400$ km ;
- constante de gravitation universelle : $G = 6,67 \times 10^{-11}$ m³·kg⁻¹·s⁻² ;
- l'étude est conduite dans le référentiel géocentrique : son origine coïncide avec le centre O de la Terre et ses axes pointent vers des étoiles lointaines. Il est supposé galiléen.

Données techniques d'un satellite Starlink :


- masse : 227 à 260 kg ;
- altitude h : entre 340 et 1 200 km ;
- vitesse de déplacement sur son orbite dans le référentiel géocentrique : $v_S = 2,73 \times 10^4$ km·h⁻¹ ;
- taille : environ 1,0 m × 1,0 m × 1,0 m.

Orbite d'un satellite Starlink

Le mouvement d'un satellite Starlink est circulaire.

Le schéma ci-contre, qui n'est pas à l'échelle, représente une partie de la trajectoire du satellite S.

L'altitude du satellite est notée h et son diamètre apparent depuis la surface de la Terre est l'angle noté α défini sur le schéma ci-contre.



1. Justifier à l'aide de la deuxième loi de Newton que le mouvement du satellite est uniforme.
2. Définir puis exprimer la période de révolution T en fonction de la vitesse v_S du satellite, du rayon terrestre R_T et de l'altitude h du satellite.
3. À l'aide de la deuxième loi de Newton, exprimer $R_T + h$ en fonction de G , M_T et v_S .


4. Calculer l'altitude h du satellite. Commenter.

Observation du satellite

Le satellite peut être observé grâce à une lunette astronomique, instrument d'optique afocal constitué d'un objectif et d'un oculaire.

L'objectif (L_1) de la lunette utilisée est modélisé par une lentille mince de distance focale $f_1' = 600$ mm et l'oculaire (L_2) par une lentille mince de distance focale $f_2' = 32$ mm.

5. Donner la signification du terme afocal.
6. Le satellite est schématisé comme un objet AB perpendiculaire à l'axe optique, situé très loin de l'objectif (à « l'infini »). Sur **l'annexe à rendre avec la copie**, construire l'image intermédiaire, A_iB_i , de AB, donnée par l'objectif, puis construire l'image finale, A_fB_f de l'objet AB par la lunette astronomique.
7. Avec l'aide du schéma ci-dessous, exprimer le diamètre apparent α correspondant à l'angle sous lequel les deux extrémités A et B du satellite sont observées depuis la surface de la Terre dans les conditions les plus favorables.



Notre œil n'est pas capable de distinguer les détails d'un objet dont le diamètre apparent est inférieur à $\alpha_{\min} = 2,9 \times 10^{-4}$ rad.

8. Indiquer si les points A et B d'un satellite Starlink peuvent être distingués à l'œil nu. On suppose que $h = 520$ km.

Le grossissement G_L de la lunette a pour expression :

$$G_L = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{f_1'}{f_2'}$$

où l'angle α' représente le diamètre apparent de l'image du satellite à travers la lunette astronomique.

9. Montrer que la lunette utilisée dans cet exercice ne permet pas d'observer les détails d'un satellite Starlink.

ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

